DESCRIPTIONS DE QUELQUES COLÉOPTÈRES ARGENTINS

par M. L. Fairmaire.

Ces Insectes dont je dois la communication à l'obligeance de mon collègue et ami, M. Dollé, proviennent pour la majeure partie de la province de Rioja, située tout à fait à l'ouest de la Confédération argentine. C'est une région encore peu explorée et qui paraît fort intéressante.

Euparia ovalipennis Har., Coleopt. Heft., VIII (1871), 116. — Long. 5 1/2 mill. — *Obscure rufa, subnitida, elongato-ovata, modice convexa; capite dense subtiliter asperulato, clypeo antice late emarginato, utrinque denticulo acuto armato; thorace æqualiter subasperato-punctato, parce breviter pubescente, basi rotundata, margine basali acuto; elytris leviter striatis, striis obsolete tantum catenulatis, interstitiis utrinque juxta strias seriatim aspero-punctulatis, punctis piliferis, medio leviter convexis.*

Deux individus provenant de Rioja s'accordent bien avec cette description ; seulement ils n'ont que 5 mill. de longueur et les mots de : *modice convexa* ne me paraissent pas exacts, car ces insectes sont très convexes ; le corselet est couvert de fines granulations qui ne deviennent confluentes et mêlées de gros points que sur les côtés. En outre, les stries des élytres sont larges, sinon profondes, et les intervalles présentent, le long des stries, des points râpeux, piligères, qui, au premier abord, font paraître ces stries crenelées. Le bord antérieur du chaperon est non pas échancré, mais largement sinué.

Athyreus chalybeatus. — Long. 15 mill. — *Subglobosus, obscure æneo-cœrulescens, elytris nitidis, subtus rufus, dense fulvo-villosus, tibiis picescentibus; capite magis brunneo, asperato, apice fere truncato, clypeo transversim bicarinato, carina antica fere apicali, medio dentata et cum mediana juncta, hac tridentata, dende medio magis elevato, genis acute angulatis, vertice medio anguste breviore et obsolete bituberculato, antennis rufis; prothorace amplo, elytris latiore, lateribus valde deflexis, antice rotundatis, postice angulatim dilatatis, dorso dense granulato, granulis setuliferis, disco antice retuso, medio carinis duabus basi approximatis, antice gradatim divaricatis et transversim recte conjunctis, utrinque carinulis 3 brevioribus, subtransversis; elytris brevibus, late sulcatis, sulcis rugoso-punctatis, intervallis carinatis, lævibus, valde nitidis, lateribus confuse punctato-rugosulis, parte anteapicali fere lævi, costula marginali parum elevata; metasterno nudo, subtiliter asperulo, pedibus validis.* — Plata orientale.

Ressemble assez à l'*A. corinthius* Klug du Brésil; mais outre la coloration bien différente, les carènes médianes du corselet sont réunies en avant par une carène transversale et les élytres ont des côtes saillantes.

Liogenys opacicollis. — Long. 11 mill. — *Oblongus, crassus, castaneus, nitidus, fulvo-pilosulus, capite prothoraceque subopacis, fere metallicis; capite sat lato, antice angustato, margine antico fere arcuatim emarginato, angulis latis, parum acutis, fortiter ac dense punctato, rugoso, palpis antennisque rufulis; prothorace transverso, elytris angustiore, antice angustato, lateribus ante medium angulato-rotundatis, dorso dense ac fortiter punctato-rugoso, margine antico fere recto, postico late leviter sinuato; scutello apice rotundato, dense punctato, spatio medio lævi elevato; elytris medio vix ampliatis, fortiter sat dense punctatis, sutura sat elevata, utrinque costulis 4 parum elevatis; pygidio rugoso, pubescente; subtus dense griseo-squamosus, abdonine medio denudato, dense rugoso-punctatus, tibiis anterioribus sat fortiter tridentatis, tarsis sat elongatis, subtus pilosis.* — Rioja.

Ressemble pour la forme générale au *L. obscurus*, mais bien distinct par la sculpture rugueuse de la tête et du corselet qui sont presque mats, par la forme des dents du chaperon qui sont simplement anguleuses, non détachées du bord, et par la vestiture squameuse du dessous du corps.

Liogenys bidentulus. — Long. 9 mill. — *Oblongus, valde convexus, rufo-fulvus, nitidus, capite et prothorace antice interdum infuscatis; capite minore, fronte planata, grosse parum profunde punctata, clypeo paulo læviore, sutura clypeali sat impressa, margine antico utrinque dente protenso armato; prothorace elytris paulo angustiore, lateribus ante medium angulato, grosse sed parum profunde laxe punctato, lateribus et basi laxius; scutello obtuse ogivali, fere lævi; elytris oblongis, medio leviter ampliatis, leviter striatis, intervallis fere planis, alternatim angustioribus, 1° latiore, sat fortiter sat dense punctato, ceteris tenuiius ac rarius punctatis, apice fere lævibus; pygidio lato, obtuso, fere lævi, subtus parce punctatus, pilis longis hirtus, metasterno profunde sulcato, tarsis elongatis, antennarum clava elongata, pallida.* — Rioja.

Voisin du *L. fulvescens* Bld., distinct par sa taille plus faible et surtout par le corselet dont les côtés sont angulés et dont la ponctuation grosse, mais peu profonde, est très écartée, surtout à la base et sur les côtés; la sculpture des élytres est aussi bien différente.

Ligyrus bidentulus. — Long. 16 mill. — *Ovatus, convexus, castaneus, nitidus, capite prothoraceque paulo magis obscuris; capite sat brevi, antice triangulari, lateribus vix sinuato, rugoso-punctato, apice levissime recurvo et acute bidentulo, carina frontali sat acuta, medio paulo interrupta, prothorace tranverso elytris vix angustiore, antice a medio sat fortiter angustato-rotundato, dorso sat grosse parum dense punctato, plagula media postica lævi; margine antico medio obtusissime tuberculato et supra obsoletissime impresso; scutello triangulari, lævi, elytris sat fortiter et oblique punctato-lineatis, utrinque lineis 3 geminatis regularibus, intervallo 1° basi lato, irregulariter punctato, sutura elevata; pygidio subtilissime asperulo-reticulato, medio sat elevato; pectore dense rufo-villoso, abdomine lævi lateribus punctulato, pedibus brevibus, validis, femoribus latis, tibiis anticis valde tridentatis.* — Rioja.

Bien plus grand et moins court que le *L. Burmeisteri* Steinh. avec le chaperon se terminant par deux très petites dents aiguës, légèrement relevées; le corselet et les élytres sont moins grossement ponctués et la sculpture du pygidium est très différente.

Ligyrus distinctus. — Long. 13 mill. — *Præcedenti affinis, similiter coloratus, sed minor, capite potius punctato, clypeo apice denticulis multo minoribus et minus acutis armato, prothorace lateribus minus angulatim rotundato et pygidio punctis ocellatis parum densis et parum profundis impresso.* — Rioja.

Cette dernière espèce ressemble, plus que la précédente, au *L. Burmeisteri* qui est plus petit, plus court, avec les pointes et la carène du chaperon plus effacées, et la ponctuation du corselet et des élytres plus grosses, celles-ci ayant de faibles stries avec les intervalles assez convexes, et les points du pygidium ne sont pas ocellés.

Cyclocephala occipitalis. — Long. 12 à 13 mill. — *Oblonga, sat fortiter convexa, rufo-testacea, nitida, capite obscuro, summo infuscato, abdomine interdum fumato, tibiis apice tarsisque paulo obscurioribus; capite dense sat subtiliter punctato-rugoso, clypeo antice leviter attenuato, margine antico parum reflexo, fere recto, utrinque rotundato; prothorace transverso, elytris vix angustiore, antice arcuatim angustato, basi fere recta, haud marginata, angulis posticis sat rotundatis, dorso sat dense parum fortiter punctato, medio vitta læviore parum distincta; scutello triangulari, punctato; elytris medio vix ampliatis, parum dense modice punctatis, sutura et utrinque lineis 3 paulo elevatis, intervallo 1° latiore, costulis utrinque linea punctata comitatis; pygidio modice convexo, subtiliter punctulato; subtus fere lævis, segmentis*

ventralibus transversim aspero-punctatis, punctis setiferis, tibiis anticis grosse tridentatis, tarsis anticis ♂ articulo ultimo crasso, unguibus magnis, externo crasso longiore. — Rioja.

Ressemble un peu au *C. hirta* Le C., mais bien plus étroit, avec le chaperon bien plus arrondi en avant, le corselet plus fortement ponctué, à angles postérieurs arrondis, les élytres plus étroites, plus longues, moins ponctuées et le pygidium bien moins court.

Dysides platensis. — Long. 8 à 11 mill. — Ressemble extrêmement à l'*obscurus* Perty, de Colombie et de l'Équateur, allant jusqu'à St Paul, au Brésil, mais plus petit, avec les antennes moins grêles, le corselet plus rétréci en arrière, ayant le bord antérieur tuberculé, les 4 tubercules placés transversalement sur le disque, plus gros et plus saillants, les angles postérieurs relevés en oreillette plus ou moins saillante, les élytres ayant une tache de chaque côté de l'écusson.

Ces insectes font bien la transition des Ptiniores aux Térédiles et présentent une grande analogie avec le g. *Polycaon* pour la tête, la bouche et les antennes ; mais les tarses sont un peu différents, le 2e article n'étant pas long comme le 5e et le 1er un peu plus long que le 2e ou égal. Le g. *Apoleon* Gorh., diffère à peine des *Dysides* et ne s'en distingue que par un article de plus au funicule des antennes et le 2e article des tarses presque aussi long que le 5e ; le faciès est le même, mais la patrie est très différente, l'*A. edax* Gorh. provenant de la région malaise.

Xylopertha hexacantha. — Long. 5 mill. — *Oblonga, cylindrica, picea, nitida, prothorace interdum basi rufescente ; capite brevi, subtiliter punctato-rugosulo, fulvo-pubescente, inter oculos linea tenui, medio bigranulata signato, labro fulvo-piloso, oculis globosis, prominulis, antennis rufulis, clava valde elongata, articulo ultimo acuminato, præcedenti longiore ; prothorace subquadrato, antice paulo angustato, dorso basi subtilissime punctato, antice retuso, sat subtiliter dense asperato, lateribus antice dentibus aliquot acutis ; elytris oblongis, apice abrupte truncatis, fortiter punctatis, humeris rufo-piceis, sutura elevata, utrinque costulis* 3, *externa obsoleta, apice in dentem validum terminatis, parte apicali fere lævi, acute marginata, sutura apice dehiscente, angulo sturali ♂ sat producto, pedibus rufopiceis.* — Rioja.

Cardigenius densegranatus. — Long. 11 mill. — *Ovatus, valde convexus, fusco-picescens, subopacus, setulis brevissimis sat dense vestitus ; capite asperulo, clypeo rufescente, fere truncato, labro rufescente, antennis brevibus, prothoracis medium paulo superantibus, rufo-piceis, apice haud incrassatis ; prothorace valde transverso, elytrorum basi paulo latiore, antice angustato, lateri-*

bus sat fortiter rotundatis, sat late deplanatis, extus dense setulosis, dorso convexo, æquali, dense subtiliter, medio paulo laxius, asperato, margine postico ante angulos sinuato, his sat obtusis sed paulo retroversis; scutello lato, brevi, medio acute producto; elytris brevissime ovatis, postice valde declivibus, apice obtuse rotundatis, sat dense asperulis; subtus cum pedibus magis piceo-rufescens, subtilius et densius asperulus, densius setosulus, prosterno fusco, nitido, fere lævi, mesosterno latissimo, tibiis asperatis, extus denticulatis, anterioribus apice extus acute angulato-productis. — Plata.

Ressemble, pour la forme, au *C. crinifer*, mais la sculpture est très différente, étant formée de très fines aspérités, mélangées de petites soies extrêmement courtes au lieu de longs poils hérissés sur les élytres.

AMBIGATUS n. g.

Ce nouveau genre est voisin des *Melanophorus* dont il diffère par les hanches plus globuleuses, bien moins saillantes, la saillie intercoxale assez courte, en triangle pointu, les yeux plus gros, les antennes plus grêles, le 3e article à peine plus long que le 2e, les avant-derniers triangulaires, un peu dentés, le corps moins convexe, le corselet moins globuleux, nettement marginé sur les côtés, avec les angles postérieurs bien marqués, les élytres plus oblongues, à épaules plus angulées; les tarses sont grêles, le 4 article des postérieurs est presque plus long que les 2 suivants réunis.

A. rufonitens. — Long 4 1/2 mill. — *Oblongus, subelongatus, modice convexus, rufus, nitidus, capite ovato, substiliter dense punctato, utrinque ad antennas valde impresso, clypeo antice rotundatim angulato, oculis sat grossis, antennis prothoracis basin paulo superantibus, articulo* 1° *crasso, secundo paulo longiore; prothorace parum transverso, elytris angustiore, postice angustato, lateribus antice leviter rotundatis, angulis posticis acutiusculis, dorso subtiliter parum dense punctato, lateribus sat fortiter marginato, basi medio late rotundato et utrinque sat fortiter impresso; scutello minutissimo; elytris ovato-oblongis, dorso paulo planiusculis, apice parum fortiter declivibus et conjunctim obtusis, subtiliter punctato-lineatis, linea suturali postice substriata.* — Rioja.

On trouve au Tucuman deux insectes qui se rapprochent beaucoup de celui-ci à raison du corselet marginé; ils en diffèrent par le corps plus convexe, les élytres plus courtes, les antennes plus épaisses et les tarses moins grêles. Ils forment le passage au g. *Melanophorus*.

A. strictícollis. — Long. 4 mill. — Même coloration que le précédent, mais plus court et plus convexe, tête plus faiblement impressionnée près des antennes, chaperon moins angulé, yeux un peu moins gros, antennes un peu épaissies vers l'extrémité, 2e article un peu plus court que le 3e, corselet peu convexe, presque cordiforme, densément et rugueusement ponctué, fortement marqué sur les côtés, non impressionné à la base, élytres plus courtes, un peu élargies au milieu, à épaules arrondies, mais marquées, à ponctuation très finement rugueuse avec des traces de lignes peu distinctes, extrémité obtuse, un peu plus déclive.

A. bembidioides. — Long. 5 mill. — Un peu plus grand que le précédent, même coloration, un peu plus convexe, tête un peu moins courte, densément ponctuée, impressionnée antérieurement en demi-cercle, antennes un peu plus épaisses, 2e article presque plus long que le 3e, corselet plus convexe, densément ponctué mais non rugueux, les côtés non sinués en arrière, angles postérieurs moins marqués, élytres plus larges, plus convexes, à épaules bien arrondies, plus fortement déclives et plus arrondies à l'extrémité, à stries ponctuées à peine enfoncées mais bien distinctes, les intervalles finement coriacés avec des points très fins, tarses moins grêles.

Epitragus æneus. — Long. 12 mill. — *Oblongo-ellipticus, æneus, nitidus, modice convexus, undique dense punctatus; capite antice utrinque oblique striato, margine antico utrinque leviter sinuato, antennis gracilibus, piceo-æneseentibus, basin prothoracis haud attingentibus, apice vix crassiusculis, articulo* 3° *sequenti parum longiore; prothorace elytris angustiore, valde transverso, antice angustato, lateribus a basi rotundatis, angulis anticis obtusissimis, margine postico utrinque sat fortiter sinuato, angulis acutis; scutello obtuso, concavo; elytris oblongis, postice angustatis, apice acuminatis, subtiliter punctulato-substriatis, intervallis planis, sat dense punctatis; subtus sat subtiliter dense punctatus, prosterno rugosulo, medio villoso, segmentis abdominalibus extus acute dentatis, pedibus æneo-piceolis, sat gracilibus.* — Plata.

Se trouve aussi au Brésil, province des Mines.

Ressemble au *metallicus*, mais bien moins densément ponctué, les antennes sont plus grêles, moins épaisse vers l'extrémité, la tête présente en avant deux impressions bien marquées en forme de stries, l'écusson est plus court, les élytres ont les stries plus distinctes; le dessous du corps est plus densément et plus fortement ponctué.

Epitragus rufocastaneus. — Long. 8 à 12 mill. — *Sat*

elongatus, rufo-castaneus, nitidus, sat convexus; capite subtiliter densissime punctato, clypeo fere truncato; antennis paulo dilutioribus, articulo 9° *quarto longiore, articulis* 9-10 *brevioribus, triangularibus,* 11° *ovato; prothorace subquadrato, elytris multo angustiore, antice leviter parum attenuato, postice haud angustato, dorso subtiliter sat dense punctato, margine postico medio rotundato, angulis posticis et anticis fere rectis; scutello lævi, fere concavo, apice rotundato, elytris ovato-oblongis, post medium leviter ampliatis, apice acuminatis, dense punctato-asperis, utrinque lineis* 3 *vix elevatis; subtus dense subtiliter asperulus;* ♂ *angustior, minor, elytris haud sensim ampliatis.* — Rioja.

Paraît très voisin de l'*E. porcellus* Berg, mais chez ce dernier le labre est saillant, arrondi, légèrement sinué de chaque côté, le corselet est un peu rétréci en arrière avec les angles postérieurs obtus, et en dessous le prosternun est grossement ponctué avec la base les segments ventraux obsolètement et longitudinalement rugueuse.

Epitragus nitidicollis. — Long 12 mill. — *Præcedenti forma affinis sed obscurus, fusco-piceus, modice nitidus, glaber, prothorace nitidissimo; capite dense punctato, summo multo subtilius, clypeo antice fere truncato, utrinque leviter sinuato, antennis piceis, articulo* 3° *secundo plus duplo longiore, articulis* 8-10 *triangularibus,* 11° *haud longiore, breviter ovato, acuminato; prothorace elytris valde angustiore, antice leviter parum attenuato, lateribus ante angulos anticos levissime sinuatis, his acutis, paulo extraversis margine postico medio sat fortiter rotundato, angulis obtusiusculis, dorso lævi, polito, scutello lævi, apice rotundato; elytris ovato-elongatis, apice obtuse acuminatis, dorso sat dense fortiter punctatis, basi paulo scabriusculis, postice gradatim subtilius punctatis; subtus subtiliter asperulus, femoribus asperis.* — Rioja.

J'aurais volontiers rapporté l'unique individu de cette espèce à l'*E. lævicollis* Berg, mais ce dernier paraît pubescent, le chaperon est largement sinué au milieu, le corselet est très finement ponctué, très convexe, un peu rétréci en arrière avec les angles postérieurs subarrondis et les antérieurs seulement un peu saillants, l'écusson est ponctué et les élytres sont densément et âprement ponctuées.

Epitragus crassus. — Long. 17 à 20 mill. — *Oblongo-ellipticus, sat fortiter convexus, fusco-brunneus, nitidus; capite brevi, dense punctato, clypeo fere rugoso, transversim leviter impresso, margine antico subtruncato, antennis gracilibus, basin prothoracis vix superantibus, articulis* 8-10 *brevioribus, magis triangularibus,* 11° *breviter ovato, acuminato; prothorace elytris angustiore,*

longitudine duplo latiore, a basi antice augustato, lateribus vix arcuatis, dorso laxe subtiliter punctato, margine postico medio rotundatim lobato, utrinque sinuato, angulis posticis acute rectis, anticis acutis; scutello lævi, truncato; elytris post medium vix sensim ampliatis, apice acuminatis, dorso fortiter sat dense punctatis, spatio suturali paulo elevato, utrinque lineolis 3 vix distincte elevatis; subtus dense punctato-asperatus, metasterno medio sulcato, pedibus sat magnis, rugosis. — Rioja.

Paraît voisin de l'*E. Bacchulus* Berg, mais en diffère par la tête non pileuse, à ponctuation serrée, presque rugueuse sur le devant, le corselet à ponctuation fine, écartée, l'écusson tronqué et les élytres plus longues, à ponctuation non râpeuse, égale. Paraît plus voisin de l'*E. gigas* Steinh., mais chez ce dernier le corselet est rétréci en avant et en arrière, avec les angles postérieurs obtus, et les élytres sont rugueuses latéralement avec deux impressions à la base de chacune.

Epitragus nanus. — Long. 6 mill. — *Oblongo-ovatus, parum convexus, fusco-piceus, parum nitidulus, breviter sat dense fulvo-pilosulus, subtus cum pedibus, ore et antennis piceo-rufescens; capite subtiliter densissime punctulato, clypeo antice arcuatim sinuato, labro exserto, sat magno, punctato; antennis gracilibus, prothoracis basin haud attingentibus, apice leviter crassioribus; articulo 3° sequenti parum longiore; prothorace transverso, elytris vix angustiore, a basi antice attenuato, lateribus fere rectis, angulis anticis acutiusculis, dorso subtiliter dense punctulato, basi medio arcuato, utrinque sinuato, subtiliter marginato et leviter impresso, angulis posticis acutis sed vix porrectis; scutello minuto, punctulato; elytris ovatis, medio vix ampliatis, apice obtusis, dense subtiliter punctato-asperulis, haud striatis, suturam versus utrinque lineolis 2 obsoletissime indicatis; subtus subtilissime punctato-asperulus, prosterno lateribus paulo fortius, pedibus sat gracilibus.* — Plata.

Cet *Epitragus* est le plus petit du genre avec l'espèce que je décris ci-après; il est assez remarquable par sa fine sculpture et sa fine villosité.

Epitragus minutissimus. — Long. 5 1/2 mill. — *Oblongo-ovatus, modice convexus, fusculo-æneus, sat nitidus, glaber; capite prothoraceque subtiliter densissime punctatis, antennis piceis, parum gracilibus, prothoracis basin haud attingentibus, apicem versus crassioribus, articulo 3° sequenti parum longiore; prothorace amplo, elytris haud angustiore, antice paulo angustato, lateribus a basi rotundatis, angulis anticis sat obtusis, dorso æquali, basi sat fortiter bisinuato, medio rotundatim, fere lobato et*

obsolete marginato, angulis obtuse rectis; scutello minuto; elytris a medio attenuatis, apice obtusis, punctato-lineatis, lineis leviter elevatis, punctis parum impressis, nitidulis, intervallis planis, subtiliter et parum regulariter subseriato-punctatis; subtus nitidior, sat dense punctulatus, pectoris lateribus et prosterno paulo rugosis, pedibus fere lævibus. — Brésil, province de S^{t} Paul.

Cette espèce est remarquable, outre sa petite taille, par son corselet ample, arrondi latéralement, peu rétréci en avant, par les élytres dont les lignes ponctuées sont légèrement en saillie et par sa ponctuation ocellée, très peu profonde.

Platydema basicorne. — Long. 6 mill. — *Oblongo-ovatum, convexum, fuscum, opacum, pedibus, ore et antennarum articulis 2 primis rufis; capite subtiliter punctato, clypeo antice tranversim sulcato, antennis sat gracilibus, apicem versus paulo crassioribus, articulo 3° sequenti vix longiore, sed angustiore; prothorace transverso, antice angustato, lateribus a basi arcuatis, dorso lævi, basi bisinuato, angulis posticis sat obtusis; scutello lævi, triangulari, elytris ovato-oblongis, apice obtusis, dorso subtiliter substriato-punctatis, intervallis lævibus, vix convexiusculis; subtus paulo rufescens, nitidior, prosterno medio convexiusculo.* — Plata.

Ressemble au *P. europæum*, mais plut petit, plus étroit, avec les antennes un peu plus longues, différemment colorées, à articles moins transversaux, le corselet moins court, les élytres un peu moins marginées latéralement, à intervalles encore moins convexes.

Ulosonia parvicornis. — Long. 6 mill. — *Oblonga, subparallela, rufo-picea, nitida, subtus cum pedibus, ore et antennis magis rufescens; capite lævi, inter oculos late concavo et ad oculos utrinque dente sat brevi, compresso, apice obtuso armato, clypeo convexo, antice dente minuto acuto armato; antennis basin prothoracis attingentibus, articulis 5-10 transversis, 3° quarto vix longiore; prothorace angustato, dorso subtilissime punctulato, inter discum et margines evidentius punctato, basi sat fortiter bisinuato, medio obsoletissime et utrinque leviter impresso, angulis posticis sat acutis; scutello obtuso; elytris sat fortiter substriato-punctatis, stria suturali sat impressa, intervallis plauiusculis, vix perspicue punctulatis; subtus fere lævis, femoribus compressis.* — Plata.

Ressemble assez à l'*U. vacca*, en diffère ainsi que des autres espèces, par sa taille plus faible, les cornes céphaliques bien plus courtes, et surtout par la forme du corselet qui ne s'élargit pas en avant, les côtés étant parallèles en arrière; les côtés du prosternum sont à peine distinctement striolés.

Allecula seriatopora. — Long. 9 mill. — *Sat elongata, convexa, piceo-fusca, subopaca, elytris leviter nitidulis, sericeis, femoribus plus minusve piceo-rufis; capite sat subtiliter rugosulo-punctato, sutura clypeali valde impressa, antennis sat gracilibus, corporis medium attingentibus, articulo 3° sequenti æquali; prothorace valde transverso, elytris angustiore, lateribus fere parallelis, antice tantum rotundatis, ante basin obsoletissime sinuatis, dorso medio dense punctato, lateribus fere lævi, postice leviter triimpresso, margine postico vix bisinuato, angulis acutiusculis; scutello apice rotundato, lævi; elytris elongatis, a medio leviter attenuatis, apice conjunctim rotundatis, dorso punctis grossis oblongis seriatim impressis, apice vix minoribus, intervallis lævibus; subtus nitida, fere lævis, pectore lateribus punctato, femoribus punctulatis, tibiis leviter asperulis.* — Plata.

Forme et coloration de l'*A. brunnea*, mais bien plus petite; la sculpture des élytres formée de gros points oblongs, sans stries, distingue cette espèce de ses congénères.

Strongylium platense. — Long. 17 mill. — *Elongatum, convexum, obscure æneum, nitidum, subtus cum pedibus obscurius; capite dense punctato, oculis distantibus, clypeo lævissime sinuato, antennis fuscis, articulis 6 ultimis latis, opacis; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus fere parallelis, antice tantum cum angulis rotundatis, dorso fortiter sat dense, disco minus punctato, basi utrinque late sinuato, leviter marginato; scutello obtuse ogivali, vix perspicue punctulato; elytris elongatis, fortiter striatis, striis subtiliter crenatis, intervallis convexis, lævibus, apice fere costulatis; pectore punctato, metasterno medio subtiliter strigosulo, abdomine indistincte, lateribus evidentius punctulato, pedibus sat elongatis, femoribus subtus dense brevissime pilosulis.* — Rioja.

Ressemble assez aux *S. auratum* et *hæmorrhoidale;* le corselet n'est pas tuberculé latéralement, mais la ponctuation est écartée, les stries des élytres sont très finement crénelées et les articles des antennes sont larges à partir du 5e. Jusqu'à présent on n'a décrit que deux *Strongylium* de la région argentine, mais ils sont notablement plus petits, la coloration est différente ainsi que la sculpture de la tête et du corselet.

Aryenis minor. — Long. 7 mill. — A. uniculori Bl. (Statira) *facie et colore simillima, sed minor, angustior et pallidior, capite angustiore, minus dense et minus fortiter punctato, punctis haud strigosis, antennis gracilioribus et elytris irregulariter punctatis, lineis nullis.* — Rioja.

Plus petit et plus pâle que l'*A. unicolor* Blanch. (*rufescens* F.

Bates) ; la tête est plus étroite, plus prolongée en avant, bien moins fortement ponctuée, et les points sont moins serrés, nullement striolés, les antennes sont plus grêles, plus longues, atteignant le milieu des élytres, le 2e article plus court que le 4e, la ponctuation des élytres est plus égale, proportionnellement plus serrée, sans traces de lignes longitudinales.

Rhipiphorus argentinus. — Long. 5 mill. — *Oblongus, postice attenuatus, niger, prothorace rufo, elytris fulvis, apice et interdum basi, paulo infuscatis; capite subtiliter sat dense rugosulo-punctato, vertice elevato, transversim compresso et antice depresso, antennis brevibus, fuscis, basi piceis, gracilibus; prothorace fortiter sat dense punctato, utrinque postice profunde impresso, lobo medio apice haud elevato nec impresso ; elytris postice gradatim angustatis, vix divaricatis, apice acutis, dorso sat subtiliter, apice evidentius punctulato-rugosulis, longitudinaliter sat fortiter impressis; tibiis tarsisque interdum ferrugineis.* — Plata.

Ressemble un peu au *R. rufipennis*. du Chili, mais bien distinct par sa coloration et ses élytres plus étroits, très peu divariquées à l'extrémité, quoique déhiscentes dès le milieu.

Epicauta griseonigra Fairm. *var.* **Riojana**. — Long. 13 à 16 mill. — *Oblongo-elongata, valde convexa, fusco-nigra, pube griseo-cinerea densissime et undique vestita, elytris sæpius utrinque vitta discoidali denudata, ante apicem abbreviata, rarissime subintegra, sæpius medio plus minusve interrupta; capite prothorace paulo latiore, convexo, antice abbreviato, clypeo fere truncato, sutura clypeali profunde arcuata, fronte utrinque prope oculos puncto signata; antennis denudatis, medium corporis attingentibus, parum gracilibus, articulo 3o quarto longiore; prothorace parum transverso, elytris angustiore, antice abrupte angustato, margine postico et angulis rectis, dorso æquali; scutello truncatulo; elytris apice rotundatis et paulo dehiscentibus; tibiis apice tarsisque denudatis.* — Rioja.

Cette *Epicauta* ressemble beaucoup, quand la bande des élytres est bien marquée, au type de l'*E. grisconigra* Fairm., de Mendoza; mais elle est plus grande, la bande des élytres n'est bien marquée qu'à la base et à l'extrémité, presque toujours plus ou moins effacée au milieu, jamais régulière comme dans le type; en outre la tache frontale quand elle existe, est peu marquée. Je ne puis néanmoins voir dans cet insecte qu'une variété locale.

M. Berg (Stett. *ent. Zeit*, 1881, 904) réunit à cette espèce la *Cantharis digramma* Burm. (*l. c.* 24). La discription s'y rapporte, il est vrai, assez bien, mais elle indique les pattes comme : *dilute*

rufis, et la suture comme noire, ainsi que le fin sillon longitudinal de la tête et du corselet.

Ananca sellata. — Long. 5 1/2 à 10 mill. — *Elongata, fulvo-testacea, nitidula, subtiliter fulvo-pubescens, elytris fere opacis, piceolis, vitta media lata pallide fulva, sutura antice sæpius paulo prolongata, transversali capite ovato, dense punctulato, oculis ovatis, parum convexis, mandibulis elongatis, apice arcuatis et fuscis, labro magno, apice rotundato; antennis gracilibus, medium corporis attingentibus, articulo 2° minuto, 3° quarto vix breviore, ceteris subæqualibus; prothorace ovato, postice sat fortiter angustato, lateribus a medio sinuatis, dorso convexo, dense subtiliter coriaceo-punctulato, antice transversim leviter impresso, basi medio impressiusculo; scutello sat lato, apice late rotundato, subtiliter punctulato; elytris ad humeros angulatim rotundatis, ante apicem angustatis, apice conjunctim rotundatis, dense subtiliter coriaceis, utrinque lineolis aliquot tenuibus, vix sensim elevatis; ♂ minor, angustior, oculis supra magis approximatis, prothorace ante basin transversim impresso, antennis longioribus.* — Rioja.

La coloration de cette espèce la rend facile à reconnaître, et n'a pas d'analogue à ma connaissance.

Ananca luridimembris. — Long. 10 1/2 mill. — *Elongata, dilute brunnea, modice nitida, pubescens, capite antice, antennis, palpis pedibus luridis; capite dense punctulato, inter oculos obsolete impressiusculo, labro magno, mandibulis apice arcuatis et fuscis, antennis gracilibus, medium elytrorum attingentibus, articulis 3°-4°que æqualibus; prothorace breviter ovato, postice angustato, lateribus basi sinuatis, dorso sat convexo, subtiliter densissime punctulato, medio oblonge impresso, lateribus vage impressiusculo; scutello triangulari, punctato, apice obtuso; elytris elongatis, ad humeros rotundatis, subtiliter densissime coriaceo-punctatis, sutura paulo elevata, utrinque lineolis 3 tenuibus, vix perspicue distinguendis; subtus densius pubescens, dilutior, segmentis ventralibus apice pallidius marginatis, pedibus sericantibus.* — Rioja.